

Medetomidina



La medetomidina es un sedante veterinario más fuerte que la xilazina. Se ha encontrado en muestras de drogas que contienen fentanilo, comúnmente conocidas como dope (droga), en todo Maryland.

Puede provocar:


- Sueño muy profundo o prolongado
- Presión arterial baja

La abstinencia puede comenzar rápido y ser grave. Es posible que necesite atención hospitalaria.

Lleve esta tarjeta al hospital si tiene síntomas de abstinencia de la medetomidina.

Diríjase al hospital en caso de:

- Tener temblores incontrolables
- No poder dejar de vomitar
- Tener dolor torácico
- Tener alteraciones del estado de conciencia
- Tener síntomas de abstinencia peores de lo habitual



Guía para proveedores de la abstinencia de la medetomidina

El tratamiento de la abstinencia de la medetomidina requiere tratar la abstinencia del fentanilo con agonistas opioides de acción prolongada, como la metadona, y usar medicamentos complementarios como:

- Clonidina
- Guanfacina
- Tizanidina
- Dexmedetomidina
- Ketamina
- Olanzapina
- Hidroxizina
- Benzodiacepinas
- Proclorperazina
- Clorpromazina



Acceda a los recursos sobre medetomidina para proveedores.

Escanee el código QR.

marylandmacs.org/tools/#silk-accordion-0-0

