



GONORREA:

Guía para parejas que recibieron la EPT



¿Por qué recibo medicamentos o una receta?

- » Su pareja sexual fue diagnosticada de gonorrea. Usted también puede tener gonorrea. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS). Las ITS se contagian a través del sexo oral, vaginal o anal. La buena noticia es que, una vez que reciba tratamiento, no contagiará a otras personas.
- » La gonorrea es fácil de tratar (curar) tomando un medicamento llamado cefixima. Este medicamento es muy seguro.
- » Su pareja sexual recibió tratamiento. Usted también necesita tratamiento. Por eso el proveedor de atención médica le entregó a su pareja un medicamento o una receta para usted. Recibir tratamiento de esta manera, sin ver a un proveedor de atención médica, se denomina terapia acelerada para la pareja (Expedited Partner Therapy, EPT).

¿Qué debo saber sobre la gonorrea?

- » La mayoría de las personas con gonorrea no presentan síntomas (señales de infección). Es posible que tenga gonorrea y no lo sepa, aun así puede transmitirla a otras personas.
- » Si presenta síntomas, puede sentir dolor o sensación de ardor al orinar (hacer pis) o secreción (goteo) por el pene, la vagina o el ano.

¿Por qué debo tomar el medicamento?

- » Si no recibe tratamiento, puede desarrollar problemas de salud graves, incluso de por vida. Tener una ITS sin tratar puede facilitar el contagio del VIH.
- » Si no recibe tratamiento, es posible que no pueda quedar embarazada.
- » Las mujeres embarazadas con gonorrea pueden transmitir la infección a sus bebés y causarles problemas de salud muy graves.

Si está embarazada o cree que puede estarlo

- » La cefixima es segura durante el embarazo. Pero, aunque tome los medicamentos, debe ver a un proveedor de atención médica de inmediato. Así podrá asegurarse de recibir la mejor atención para usted y su bebé.

Tomaré el medicamento, ¿de todas formas debería ver a un proveedor de atención médica?

- » Lo mejor es ver a un proveedor de atención médica. Pero, si no puede verlo en los próximos días, tome los medicamentos de EPT o surta las recetas que le entregó su pareja.
- » Aunque tome el medicamento, vea a un proveedor de atención médica lo antes posible para que también le realicen pruebas de detección de otras ITS. Es posible tener más de una ITS al mismo tiempo. Este medicamento no cura otras ITS.



Razones para no tomar el medicamento y ver a un proveedor de atención médica en su lugar.

La cefixima es un medicamento seguro. Pero no lo tome en estos casos:

- Siente dolor en el bajo vientre.
- Siente dolor durante las relaciones sexuales.
- Presenta vómitos.
- Tiene sarpullido o fiebre.
- Siente dolor o tiene hinchados los testículos (huevos/bolas).
- Ha tenido sarpullido, problemas respiratorios o reacción alérgica a la cefixima u otros medicamentos.
- Padece una enfermedad grave a largo plazo, como enfermedad renal, cardíaca o hepática.
- Toma otros medicamentos de venta con receta.

Si presenta alguno de estos síntomas, vea a un proveedor de atención médica lo antes posible. Su proveedor de atención médica encontrará el medicamento más adecuado para usted.



CÓMO TOMAR EL MEDICAMENTO

- » Tome la cefixima con la comida para evitar el malestar estomacal.
- » Si vomita en la hora siguiente después de haber tomado su medicamento, necesita más medicamento. En este caso, lo mejor es ver a un proveedor de atención médica lo antes posible.
- » Después de tomar su medicamento, espere al menos 7 días antes de tener relaciones sexuales. Si tiene relaciones sexuales, use un preservativo o un protector bucal (para el sexo oral) para no volver a infectarse.
- » No tome antiácidos, como Tums, Rolaids ni Maalox, durante 2 horas antes o después de tomar el medicamento.
- » No comparta ni entregue su medicamento a nadie.

Efectos secundarios

- » La mayoría de las personas no presentan efectos secundarios (se sienten mal) con la cefixima. Algunas personas pueden tener: diarrea, malestar estomacal, mareos o infección vaginal por hongos, pero no suelen ser graves.

Reacciones alérgicas

SI PRESENTA SEÑALES DE UNA REACCIÓN ALÉRGICA, llame al 911 o vaya al servicio de urgencias de inmediato. Estas incluyen: dificultad para respirar, opresión en la garganta, hinchazón en los labios o la lengua o urticaria (ronchas o protuberancias en la piel que pican mucho).

El Departamento de Salud de Maryland quiere saber si ha tenido algún problema grave con el medicamento. Si cree que ha tenido una reacción alérgica, llame al: **410-767-6700**.

Si usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres

- » También debería realizarse pruebas de detección de gonorrea y otras ITS. Dado que puede tener gonorrea, también puede tener sífilis o VIH y no saberlo. Es muy importante que vea a un proveedor de atención médica y se realice las pruebas de detección de ITS.

ITS

Evite las ITS en el futuro

- » La única forma de evitar por completo las ITS, incluido el VIH, es no tener relaciones sexuales. Si tiene relaciones, protéjase. **Use siempre un preservativo para cualquier tipo de sexo: anal, vaginal u oral. También puede utilizar un protector bucal para el sexo oral:** <https://www.cdc.gov/condom-use/communication-resources/index.html>.
- » Puede reducir las probabilidades de contraer una ITS, incluido el VIH, al hablar con sus parejas sobre la conveniencia de realizarse pruebas y recibir tratamiento.

Para obtener servicios de pruebas y tratamiento de ITS o VIH de bajo costo o gratuitos:

- Encuentre su departamento de salud local en health.maryland.gov/sexualhealth
- Visite gettested.cdc.gov
- Llame al **800-232-4636 / TTY: 888-232-6348**