Recomendaciones de vacunación contra virus respiratorios de Maryland para 2026-2027

Recomendaciones sobre las vacunas contra la gripe, el virus sincicial respiratorio (VSR) y el COVID-19 para la temporada de virus respiratorios 2026-2027. Los calendarios completos para niños y adultos están disponibles en health.maryland.gov/recommendedvaccines.

Edad/Situación	Vacuna antigripal	Vacunación contra el VSR	Vacuna contra el COVID-19
Bebés y niños	**Todos los niños de 6 meses o más.** Algunos niños de 6 meses a 8 años pueden necesitar 2 dosis.	**Todos los bebés <8 meses y los niños de 8 a 19 meses con factores de riesgo.** Nirsevimab o clesrovimab para bebés menores de 8 meses; los niños de 8 a 19 meses solo deben recibir nirsevimab. Generalmente, se administra entre octubre y marzo si la madre no recibió la vacuna contra el VSR. **O**	**Todos los niños de 6 a 23 meses y los niños de 2 a 18 años con factores de riesgo o cuyos padres desean protegerlos.**
Durante el embarazo	**Todas las mujeres embarazadas o en período de lactancia.** Administrar en cualquier momento durante el embarazo o el período posparto.	**Entre las 32 y 36 semanas de gestación** (SOLO Abrysvo). Generalmente se administra entre septiembre y marzo.	**Todas las mujeres embarazadas o en período de lactancia.** Administrar en cualquier momento durante el embarazo o el período posparto.
Adultos de 18 a 50 años	**Todos los adultos de 18 a 50 años.**	**Durante el embarazo** (ver arriba). Los adultos menores de 50 años que estén inmunocomprometidos deben consultar con su profesional de la salud sobre las vacunas contra el VSR.	**Todos los adultos de 18 a 50 años.** Especialmente importante para las personas que presentan un mayor riesgo o que nunca recibieron una vacuna.
Adultos de 50 años o más	**Todos los adultos de 50 años o más.** Se prefieren las vacunas antigripales de dosis alta, recombinantes o con adyuvante para los adultos de 65 años o más, si están disponibles.	**Todos los adultos de 75 años o más y los adultos de entre 50 y 74 años con factores de riesgo.** Una dosis única de por vida de la vacuna contra el VSR.	**Todos los adultos de 50 años o más.** Especialmente importante para las personas que presentan un mayor riesgo o que nunca recibieron una vacuna. **Para adultos de 65 años o más:** recibir dos dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19, con un intervalo de seis meses entre cada una.

Recomendaciones de vacunación de Maryland: health.maryland.gov/recommendedvaccines