


그것은 무엇일까요?

원숭이두창은 원숭이두창 바이러스에 의한 드문 감염입니다. 미국, 캐나다, 유럽 등 일반적으로 발견되지 않는 지역에서 점점 더 많은 사례가 보고되고 있습니다.

원숭이두창은 발진이 포함하여 여러분을 아프게 할 수 있으며, 때로는 독감과 같은 질병이 있습니다.

어떻게 퍼졌나요?

바이러스는 다음과 같이 가까운 접촉, 개인 접촉 또는 피부 대 피부 접촉을 통해 누구에게나 전염될 수 있습니다:



원숭이두창 발진, 통증 또는 딱지와 접촉



원숭이두창에 걸린 사람이 사용한 물체, 천(의류, 침구 또는 수건) 및 표면과 접촉



원숭이두창에 걸린 사람의 호흡기 비말이나 침을 통해



임신한 사람은 임신 중에 태아에게 바이러스를 전파할 수 있다

▶ 이러한 유형의 접촉은 다음 중에 발생할 수 있습니다:

- 포옹, 키스, 만지기, 마사지
- 가깝고, 성적인 접촉
- 원숭이두창에 걸린 사람과 장시간 대면 접촉

■ 침구, 수건, 섹스 장난감과 같이 원숭이두창에 걸린 사람이 사용한 천과 물건을 성관계 중에 만지는 것

▶ 그 바이러스는 원숭이 두창에서 나온 액체나 고름으로 퍼질 수 있습니다. 정액이나 질액에 존재하는지 여부는 아직 알려지지 않았습니다.

어떤 증상이 있나요?

▶ 원숭이두창은 발진이나 염증을 유발합니다. 또한 여러분이 독감에 걸린 것처럼 느끼게 할 수 있습니다.

▶ 독감과 유사한 증상은 다음을 포함할 수 있습니다:

- 열
- 부은 림프
- 두통
- 오한
- 근육통과 요통
- 피로

▶ 발진이나 염증은 손, 발, 가슴, 얼굴, 음경 또는 입 안이나 질, 항문에 있을 수 있습니다.

▶ 그 상처는 여드름이나 물집처럼 보일 수 있고, 아프거나 가려울 수 있습니다.

▶ 그들은 치유되기 전에 딱지를 포함한 여러 단계를 겪을 것입니다.

▶ 원숭이두창은 증상이 시작될 때부터 모든 상처가 아물고 새로운 피부층이 형성될 때까지 퍼질 수 있습니다. 이것은 몇 주가 걸릴 수 있습니다.

증상이 있는 경우 어떻게 해야 할까요?

새로운 발진이나 원인 불명의 발진, 통증, 또는 다른 증상이 있다면...

- ▶ 의료 서비스 공급자에게 문의하십시오. 의료 보험 제공자나 건강보험이 없는 경우, <https://health.maryland.gov/CSTIP/local>을 방문하여 가까운 의료 부서를 찾아보십시오.
- ▶ 만약 가능성 있는 원숭이두창에 대한 의료 제공자를 본다면, 바이러스가 지역사회에서 유포되고 있을지도 모른다는 것을 상기시켜주세요.
- ▶ 의료 서비스 제공자와 대화하기 전에는 누구와도 가까운 신체 접촉을 피하십시오.

당신이나 파트너가 원숭이두창에 걸리면...

- ▶ 의료 서비스 제공자의 치료 및 예방 권장 사항을 따르십시오.
- ▶ 모든 상처가 아물고 새로운 피부층이 형성될 때까지 누구와도 가까운 신체 접촉을 피하십시오.



자세한 내용을 보려면 이 코드를 스캔하십시오 또는 health.maryland.gov/monkeypox을 방문하십시오

이 문서는 2022년 8월 17일에 마지막으로 수정되었습니다. 이 문서는 관련 수정이 이루어진 경우에만 업데이트됩니다.

메릴랜드 보건부 | <https://health.maryland.gov>

rev 081722A