

Bệnh đậu mùa khỉ có thể khiến quý vị bị ốm. Bệnh gây phát ban hoặc lở loét (đậu mùa). Bệnh cũng có thể khiến quý vị cảm thấy như bị cúm. Tiêm chủng là một công cụ quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Vắc-xin vẫn có thể bảo vệ trước các tình trạng bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Tiêm vắc-xin đủ cả hai liều để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất. **Hãy tham khảo ý kiến người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị** để biết liệu vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ có phù hợp với quý vị hay không.

► Các triệu chứng giống như cúm có thể

- bao gồm:
- Sốt
- Đau đầu
- Đau cơ và đau lưng
- Sưng hạch
- Lạnh run
- Mệt mỏi

► Phát ban hoặc vết loét có thể xuất hiện ở tay, chân, ngực, mặt, dương vật, bên trong hoặc trên miệng, âm đạo và hậu môn.

► Các vết loét sẽ trải qua một số giai đoạn trước khi lành. Quá trình này có thể diễn ra trong vài tuần.

Bệnh đậu mùa khỉ lây lan như thế nào?

Qua tiếp xúc gần gũi, cá nhân hoặc da kề da với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm:

- ▶ Vết phát ban, vết loét hoặc vảy của họ
- ▶ Các đồ vật, đồ vải và bề mặt họ đã chạm vào
- ▶ Giọt bắn từ đường hô hấp hoặc nước bọt của họ

Điều này có thể xảy ra trong khi:

- ▶ Ôm, hôn, đụng chạm, mát xa
- ▶ Gần gũi, quan hệ tình dục
- ▶ Tiếp xúc trực tiếp lâu dài

Thai phụ có thể lây lan vi rút sang thai nhi trong thời kỳ mang thai.

Tôi nên làm gì khi gặp vết phát ban, vết loét mới hoặc các triệu chứng khác?

- ▶ Gọi điện cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị
- ▶ Nếu không có nhà cung cấp hoặc bảo hiểm y tế, hãy truy cập health.maryland.gov/CSTIP/local để tìm một cơ sở y tế gần quý vị

Để biết thêm thông tin

Quét mã này hoặc truy cập health.maryland.gov/mpox



Tài liệu này được sửa đổi lần cuối vào ngày 02/08/2024. Tài liệu này chỉ được cập nhật khi các bản sửa đổi thích hợp được thực hiện.

Sở Y tế tiểu bang Maryland
health.maryland.gov